

Lecigon® 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml Gel zur intestinalen Anwendung

Wirkstoffe: Levodopa, Carbidopa-Monohydrat, Entacapon.

Zus.: 1 ml Gel z. intest. Anw. enth. 20 mg Levodopa, 5 mg Carbidopa-Monohydrat (entspr. 4,6 mg wasserfr. Carbidopa) u. 20 mg Entacapon. 47 ml Gel z. intest. Anw. (1 Patrone) enth. 940 mg Levodopa, 235 mg Carbidopa-Monohydrat u. 940 mg Entacapon. **Sonst. Bestandt.:** Carmellose-Na, Salzsäure 10% (z. Einstell. d. pH-Werts), Na-hydroxid (z. Einstell. d. pH-Werts), gerein. Wasser.

Anw.: Behandl. d. fortgeschr., auf Levodopa-reaktiven Parkinson-Krankh. m. schweren motor. Fluktuat. u. Hyper-/ Dyskinesie, wenn verfügb. orale Kombinat. v. Parkinson-AM nicht z. zufriedenstell. Behandl.erg. geführt haben.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Engwinkelglauk.; schwerwieg. Herzinsuff.; schwerwieg. Herzrhythmusstör.; akut. Schlaganf.; schwerwieg. Beeinträcht. d. Leberfkt.; gleichz. Anw. v. nichtselekt. MAO-Hemmern/ selekt. MAO-Hemmern d. Typs A (mind. 2 Wo. vor Behandl.beg. absetzen); Erkrank., b. d. Sympathomimetika (Adrenergika) kontraind. sind (z.B. Phäochromoz., Schilddrüsenüberfkt. u. Cushing-Syndr.); früheres malign. neurolept. Syndr. u./od. nicht-traumat. Rhabdomyolyse; verdächtige, nicht diagnost. Hautveränd. od. Melanom i. d. Anamn.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Harnwegsinfekt., Anämie, Leuko-, Thrombozytop., Agranulozyt., anaphylakt. Reakt., Gewichtszu-/abn., erhöh. Aminosäurespiegel (erhöh. Methylmalonsäure), erhöh. Homocysteinwerte i. Blut, vermind. Appetit, Vit. B6-/Vit. B12-Mangel, Angst, Depress., Schlaflos., Alptr., Agitierth., Verwirrth., Halluz., Stör. d. Impulskontr., psychot. Stör., Schlafattack., -stör., vollend. Suizid, Desorientierth., Euphorie, Furcht, erhöh. Libido, Suizidversuch/suizid. Verh., anorm. Gedanken, hedonist. homöostat. Dysregulat. (Dopamin-Dysregulationssyndr.), (schwere) Dyskinesie, Parkinson-Krankh. (M. Parkinson)/Verschlimm. d. Parkinson-Sympt. (z.B. Bradykinesie), Schwindelgef., Dystonie, Kopfschm., Hypästh., On-off-Phänomen, Parästh., Polyneuropath., Somnol., Synk., Tremor, Hyperkinesie, Ataxie, Konvuls., malign. neurolept. Syndr., eingeschr. Erinnerungsvermög., Demenz, verschwomm. Sehen, Engwinkelglauk. (Winkelblockglauk.), Blepharospasm., Doppelts., ischäm. Neuropathie d. N. opticus, unregelm. Herzfrequ., ischäm. Herzerkrank. außer Myokardinf., Palpitat., Myokardinf., Orthostasesyndr., Hyper-, Hypotonie, Phlebitis, Dyspnoe, Schm. i. Oropharynx, Aspirat.pneumonie, Dysphonie, ungewöhnl. Atemmuster, Übelk., Obstip., Diarrh., aufgetrieb. Bauch, Bauchschm. (Abdominalschm.), abdom. Beschwerden, Mundtrock., Dysgeusie, -pepsie, -phagie, Flatul., Erbr., Kolitis,

Gastrointest.blut., Hypersalivat., Zähneknirsch., Glossodyn timer, Schluckauf, Verfärb. d. Speichels, anomale Leberfkt.tests, (schwere) Hepatitis m. hauptsächl. cholestat. Elementen, Kontaktdermatit., Hyperhidr., Prurit., Hautausschl., Alopez., Erythem, Urtik.; Verfärb. v. Haut, Haaren, Nägeln u. Schweiß; Malign. Melanom, Angioöd.; Schmerzen d. Musk., d. Gewebes u. d. Skelettmusk.; Arthralg., Muskelspasm., Nackenschm., Rhabdomyol., harmlose bräunl. Verfärb. d. Urins, Chromaturie, Harninkont., -retent., Priapism., Asthenie, Brustkorbschm., Ermüd. (Fatigue), Gangstör., Schm., periph. Öd., Unwohls., Sturz, postoperat. Wundinfekt., Zellulitis a. d. Inzis.stelle, Infekt. nach e. Eingriff, postoperat. Abszess, Sepsis, Schmerzen i. Oberbauch, Peritonitis, Pneumoperitoneum, Bezoar, ischäm. Kolitis, gastrointest. Ischäm./Obstrukt., Pankreat., Dünndarmblut., -ulkus, Dick-/Dünndarmperforat., Darminvaginat., Magenperforat., gastrointest. Perforat., Dünndarmischäm., überschieß. Granulationsgewebe, Komplikat. b. Einf. d. Sonde (Nasojejunalsonde/PEG-J: Schmerzen i. Oropharynx, aufgetrieb. Bauch, Bauchschm. (Abdominalschm.), abdom. Beschw., Schmerzen, Rachenreiz., gastrointest. Verletz., ösophag. Blut., Angst, Dysphagie, Erbr., Flatulenz, Pneumoperitoneum; Duodenalgeschwür (Ulkus duodeni), Blut., eros. Duodenitis/Gastritis, Gastrointestinalblut., Peritonitis, Dünndarmulkus), Dislokat. bzw. Verschluss e. Medizinprod.; Erythem, Schmerzen a. d. Inzisionsstelle; Absond., Komplikat., Beschwerden, Blut. nach e. Eingriff; Schmerzen währ. e. Eingriffs, Reakt. a. d. Untersuch.sstelle, Komplikat. e. gastrointest. Stomas, postoperat. Ileus, durch d. Eingriff bedingte Schmerzen, Reakt. a. d. Inzis.stelle, Erkrank. d. Muskeln u. d. Bindegewebes, hämolyt. Anämie, Trismus, Horner-Syndr., Mydriasis, Blickkrampf (okulogyr. Krise), Henoch-Schönlein-Purpura; erhöh. Werte v.: Harnstoff-Stickst., alkal. Phosphat., S-AST, S-ALT, LDH, Bilirubin, Blutzucker, Kreat., Harnsäure; posit. Coomb-Test, vermind. Hämoglobin- u. Hämatokritwerte; Leukozyten, Bakt., Blut i. Urin; anfängl. Erhöh. d. dopamin. Aktivit., Spielsucht/pathol. Spielen, Hypersex.; zwanghaft. Geldausgeben od. Einkaufen; Essattacken, -zwang, Episoden plötzl. Schlafattacken.

Warnhinw.: Enth. Natrium. Hinweis: Anw. d. Patronen nur zusamm. m. d. CRONO LECIG-Pumpe.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig.

Zulassungsinhaber: LobSor Pharmaceuticals AB, Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala, Schweden

Vertrieb: STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel

Stand: November 2023